

# CUÁNDO RECURRIR A LA SALA DE EMERGENCIAS VS. ATENCIÓN DE URGENCIA VS. PEDIATRA

## ATENCIÓN DE URGENCIA



DISTENSIÓN MUSCULAR O ESGUINCE



CORTE O QUEMADURA PEQUEÑOS



INFECCIÓN O SARPULLIDO LEVES



DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE O SÍNTOMAS DE RESFRÍO

## PEDIATRA



IRRITABILIDAD O CÓLICOS



DOLOR DE OÍDO



DIARREA O VÓMITOS



DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE O SÍNTOMAS DE RESFRÍO

## SALA DE EMERGENCIAS



FRACTURA ÓSEA



CORTE O QUEMADURA GRANDES



PENSAMIENTOS SUICIDAS



DIFICULAD PARA RESPIRAR

Tylenol líquido para niños (acetaminofeno) 160 mg / 5 ml		Cantidad de medicación que debe dar por dosis
Peso (lb)	Peso (kg)	
5.5 – 6.38 lb	2.5 – 2.9 kg	1.25 ml
6.4 – 7.7 lb	3.0 – 3.5 kg	1.5 ml
7.8 – 9.2 lb	3.6 – 4.2 kg	1.75 ml
9.3 – 10.6 lb	4.3 – 4.8 kg	2 ml
10.7 – 11.7 lb	4.9 – 5.3 kg	2.25 ml
11.8 – 12.8 lb	5.4 – 5.8 kg	2.5 ml
12.9 – 13.9 lb	5.9 – 6.3 kg	2.75 ml
14.0 – 16.3 lb	6.4 – 7.4 kg	3 ml
16.4 – 18.7 lb	7.5 – 8.5 kg	3.5 ml
18.8 – 20.9 lb	8.6 – 9.5 kg	4 ml
21.0 – 23.3 lb	9.6 – 10.6 kg	4.5 ml
23.4 – 279 lb	10.7 – 12.7 kg	5 ml

Motrin líquido para niños (ibuprofeno) 100 mg / 5 ml		Cantidad de medicación que debe dar por dosis
Peso (lb)	Peso (kg)	
13.2 – 15.3 lb	6 – 6.9 kg	3 ml
15.4 – 17.5 lb	7.0 – 7.9 kg	3.5 ml
17.6 – 19.7 lb	8.0 – 8.9 kg	4 ml
19.8 – 21.9 lb	9.0 – 9.9 kg	4.5 ml
22.0 – 23.9 lb	10.0 – 10.9 kg	5 ml

### ¿Cómo sé si mi hijo tiene fiebre?

Tiene fiebre si tiene 38 °C (100.4 °F) o más (bebés y niños de todas las edades).

### ¿Por qué tiene fiebre mi hijo?

La fiebre es una defensa natural contra la infección. En algunos casos poco frecuentes, la dentición puede producir un aumento leve de la temperatura. Sin embargo, si la temperatura es de 38 °C (101 °F) o más, se aconseja que los padres consideren otras posibilidades aparte de la dentición que podrían estar provocando una temperatura más alta.

### ¿Cuándo debo tratar la fiebre?

En el caso de bebés de 2 meses o menos, se aconseja que los padres llamen primero al pediatra y que no administren ninguna medicación, ya que el niño debe ser evaluado y, tal vez, deban llevarlo a la sala de emergencias.

En el caso de niños de 2 meses o más, que presenten una temperatura de 100.4 °F o más, los padres/tutores pueden tratarlos con acetaminofeno o ibuprofeno, según se indique. Sin embargo, si la fiebre no disminuye, deben llamar al pediatra del niño.



Hackensack Meridian  
Children's Health